

Odstranění ledviny otevřenou operací přes dutinu břišní (tzv. nefrektomie transperitoneální)

Vážená paní, vážený pane,

Bylo u Vás zjištěno onemocnění ledviny, které si vyžaduje odstranění celé ledviny. Konkrétní nemoc Vám byla či bude objasněna Vaším ošetřujícím lékařem. Máte-li druhou ledvinu zdravou, nic se tím ve Vašem životě zásadně nezmění. S jednou ledvinou se dá žít plnohodnotný život, jedna ledvina zastane veškerou funkci. Dokonce existuje řada lidí, kteří se s jednou ledvinou již narodí. Po zhodnocení Vašeho onemocnění ledviny, Vaší rentgenové dokumentace, Vašich dalších nemocí a Vaší tělesné konstituce se zdá, že bude moci být provedeno odstranění ledviny otevřenou operací přes dutinu břišní.

Výkon je prováděn v poloze na zádech v celkové anestézii (volbu anestézie určuje anesteziolog). Pro zjednání přístupu k nemocné ledvině je nutné otevřít břišní dutinu a přes ní proniknout dále do prostoru za ní – do prostoru, kde se nachází ledvina. Poté jsou nalezeny a přerušeny ledvinné cévy. Následuje uvolnění ledviny, jejího tukového pouzdra a je uvolněn močovod, který je zpravidla také odstraněn společně s ledvinou a tukovým pouzdrém.

Po operaci bývá z rány vyveden drén a z močového měchýře dočasně cévka, které odstraňujeme za několik málo dní po operaci.

Komplikace : Mezi možné komplikace patří krvácení z ledvinných cév. Vždy se přesvědčujeme, že není narušena stěna střeva, pokud ano, je třeba je ošetřena přešíáním. Při prorůstání nádoru levé ledviny do sleziny je někdy nutné provedení odstranění též sleziny. Další možnou komplikací je prodloužené hojení rány z důvodu infekce.

Schéma operace:

