

## OPERACE VEZIKOURETERÁLNÍHO REFLUXU

Průtok moče močovými cestami je za normálních okolností jednosměrný, a to směrem z ledviny do močového měchýře a následně do zevního prostředí. Pokud se moč pohybuje obráceným směrem, tj. moč se navrácí z močového měchýře zpět do močovodu a ledviny, nazýváme takový stav refluxem. Ten pak může vést k močovým infekcím, jizvení ledvinné tkáně, zvýšenému krevnímu tlaku a může vyústit až v selhání ledvin.

### **Vlastní operace**

Bude v případě Vašeho dítěte prováděna v poloze na zádech z kožního řezu v podbříšku. Po otevření močového měchýře umístíme dolní úsek močovodu či obou močovodů do podslizničního tunelu. Pokud je močovod velmi široký, bude jeho průsvit zmenšen.

Po operaci jsou přes kůži podbříšku vyvedeny katétry drénující močovody a močový měchýř /dočasně odvádějí moč z močových cest/ a dále drén uložený před stěnou močového měchýře /odvádí případný sekret z rány/. Tyto katétry jsou v pooperačním období postupně odstraňovány.

### **Komplikace:**

v pooperačním období se může někdy vyskytnout zánět močových cest, kterému bráníme podáním antibiotik. Pečujeme o katétry. Při jejich neprůchodnosti tkáňovou drtí či krevní sraženinou je proplachujeme fyziologickým roztokem. I když dlouhodobá úspěšnost operace refluxu je vysoká až /98 %/, mohou se vyskytnout pozdní komplikace. Patří mezi ně přetrvávání refluxu nebo zúžení močovodu v oblasti stěny močového měchýře. Oba tyto stavy mohou vyžadovat reoperaci s odstupem několika týdnů či měsíců.