

FIXACE VARLETE - ORCHIOPEXE

Základním operačním výkonem u nesestouplého varlete je **orchiopexe**.

Operace:

Při tomto výkonu bude u Vašeho dítěte z kožního řezu v třísele otevřen tříselný kanál, varle bude uvolněno s provazcem a poté fixováno do podkožní kapsy šourku. Při nálezu drobného varlete velikosti několika milimetrů je takovéto varle odstraněno. Odstraněno bývá i normálně vyhlížející vysoko uložené varle v předpubertálním věku, neboť v tomto věku již neobsahuje zárodečné buňky a je nejvíce náchylné k nádorovému postižení.

Léčení nesestouplého varlete je nutné pro zajištění podmínek pro správnou tvorbu spermií. Narušený vývoj nesestouplého varlete je také příčinou podstatně častějšího výskytu zhoubných nádorů varlete. Přítomnost obou varlat v šourku je důležitá i z hlediska psychického vývoje jedince.

Mezi možné komplikace :

po výkonu patří hematom („modřina“) šourku, v některých případech při krátkosti semenného provazce nelze varle fixovat v dolní části šourku a je zapotřebí druhá operace s odstupem času. Po operaci bývá častým přechodným jevem otok šourku. Při nedostatečném cévním zásobení varlete může dojít k tomu, že se varle dále nevyvíjí, jeho tkáň zanikne, případně je zapotřebí s odstupem času zbytek varlete odstranit.

Schéma operace:

